InBody

ID	Wiek	Wzrost	Płeć	Data pomiaru
9	49	164	Kobieta	2018-10-12 12:25:00

Przykład
PANACEA

Panacea

Analiza składu ciała

	Wartość	Sucha masa ciała	Beztłuszczowa masa ciała	Masa ciała	Prawidłowa granica
T B W Całkowita zawartość wody w organizmie	34,7 l				29,5 ~ 36,0
Białko	9,4 kg	44,1 kg			7,97 ~ 9,70
Substancje mineralne	3,3 kg		47,4 kg		2,74 ~ 3,35
Masa tkanki tłuszczowej	21,7 kg			69,1 kg	11,5 ~ 18,50

Wskaźnik Obwodu Talii do Bioder

0,92 | 0,75 ~ 0,85

Poziom Tłuszczu Wisceralnego

9 | 10 | Niski | Wysoki

Kontrola Mięśni i Tkanki Tłuszczowej

- Kontrola Mięśni : 0 kg
- Kontrola Tkanki Tłuszczowej : -7,5 kg

Analiza Mięśniowo-Tłuszczowa

	Poniżej / Prawidłowo / Powyżej	Jednostka w %	Prawidłowa granica
Masa ciała	40 55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205	69,1 kg	49,1 ~ 66,50
S M M Masa mięśni szkieletowych	60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170	26,3 kg	22,1 ~ 27,03
Masa tkanki tłuszczowej	20 40 60 80 100 160 220 280 340 400 460 520	21,7 kg	11,5 ~ 18,50

Impedancja

Z(Ω)	PR	LR	TU	PN	LN
20 kHz	332,4	341,5	25,4	291,2	296,7
100 kHz	301,2	310	22,9	254,1	258,9

Analiza Otyłości

	Wartości	Normalny Zakres
BMI Wskaźnik Masy Ciała (kg/m²)	25,7	18,5 - 25
PBF Procentowa Zawartość Tkanki Tłuszczowej (%)	31,4 %	18 % - 28 %

$$BMI = \frac{Waga(kg)}{Wzrost(m)^2}$$

$$PBF = \frac{Tłuszcz(kg)}{Waga(kg)} \times 100$$

Wynik InBody 75

BMR 1394
Podstawowa Przemiana Materii

Notatka

Historia składu ciała



Segmentalna beztłuszczowa masa ciała

Beztł. masa ciała



Segmentalna tkanka tłuszczowa

PBF
Masa tk. tłuszcz.



▶ Segmentalny tłuszcz jest obliczony.